

6

INDICADORES

Porcentaje de mujeres infectadas por el VIH embarazadas a las que se les ha ofrecido profilaxis de transmisión vertical.

Nº de mujeres infectadas por el VIH embarazadas atendidas que han realizado profilaxis de transmisión vertical / Nº de mujeres infectadas por el VIH embarazadas atendidas

Porcentaje de pacientes* que inician tratamiento antirretroviral a quienes se les realiza previamente una prueba de resistencias genotípicas.

Nº de pacientes que inician TAR a los que se les realiza prueba de resistencia / Nº de pacientes que inician TAR

Porcentaje de pacientes* en TAR en los que se ha registrado la evaluación de la adherencia al tratamiento.

Nº de pacientes en TAR en los que se ha registrado la evaluación de la adherencia al tratamiento/ Nº pacientes en TAR

Porcentaje de pacientes nuevos o nuevas* con diagnóstico de infección VIH a quienes se les ha realizado el test de la tuberculina y se registra en la historia clínica.

Porcentaje de pacientes nuevos o nuevas* con diagnóstico de infección VIH a los que se les ha vacunado de neumococo en los primeros seis meses de seguimiento.

Porcentaje de pacientes* que inician TAR que tienen CV indetectable a los 6 meses.

Número de pacientes que inician TAR que tienen CV indetectable a los 6 meses/Número total de pacientes que inician TAR.

Porcentaje de mujeres con infección VIH que tienen realizada la valoración ginecológica (o al menos tienen realizada la citología según especifica el proceso)

Número de mujeres con infección VIH con valoración ginecológica (o con citologías según proceso)/Número total de mujeres con infección VIH

*Todos los datos estarán desagregados por sexo